



Que faire lorsque mon enfant a de la fièvre

 **Citadelle**
Pédiatrie

**CHU**
de Liège

La fièvre est évoquée si un enfant a une température supérieure à 38°C.

On préconise en général de donner un traitement médicamenteux à partir de 38°C en fonction des cas.

Mesures physiques

Avant toute prise de médicament

- _ Découvrir l'enfant totalement (laisser un lange)
- _ Maintenir une température de la pièce entre 18-20°C
- _ Faire boire le plus souvent possible

Médicaments

Respecter rigoureusement les doses et le nombre de prise indiquées.

Elles sont définies en fonction du poids de l'enfant.

En première intention

- _ Paracétamol toutes les 6 heures donc 4 fois par jour (dafalgan, perdolan, mobistix)

Si l'enfant a 3 mois et plus ET 6 kilos, en deuxième intention

- _ Ibuprofen toutes les 8h donc 3 fois par jour (ibuprofen, nurofen, malafène, perdophen)

ATTENTION EN CAS DE SUSPICION DE VARICELLE OU DE VARICELLE NE PAS DONNER DU NUROFEN





Surveillances

Utilisé un thermomètre adapté

- _ Rectal pour les moins de 2 ans
- _ Tympanique/rectal pour les plus de 2 ans

Recontrôle

- _ 1 heures post traitement
- _ Quand comportement inhabituel
- _ Pâleur, transpirant
- _ Votre enfant semble chaud
- _ Frissons

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 71 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

